



IDA-TALLINNA KESKHAIGLA

AS Ida-Tallinna Keskhaigla
Ravi 18, 10138 Tallinn
Rg-kood 10822068
Tel 666 1900
E-post info@itk.ee
www.itk.ee

Düslipideemia

Käesoleva infolehe eesmärk on tutvustada patsiendile düslipideemiat ehk vere kolesteroolisisalduse suurenemist ning anda soovitusi, kuidas selle tõsise haiguse väljakujunemist või arengut vältida.

Südame-veresoonkonna haigused on Eestis kõige sagedasemad haigestumise ja surma põhjused. Südamehaigused on otseselt seotud elustiili ja käitumuslike riskiteguritega (suitsetamine, eba tervislik toitumine, ülekaal, vähene füüsiline aktiivsus, pingeline ja stressirohke elu).

Südame-veresoonkonna haiguste kujunemisel on üks olulisemaid riskifaktoreid vere kolesteroolisisalduse suurenemine ning struktuuri muutumine ehk düslipideemia. Allpool annamegi soovitusi, kuidas Teie ise saate seda haigust vältida.

Mis on vererasvad ehk kolesterool ja triglütseriidid?

Kolesterooli on vaja kudede ülesehitamiseks ning bioaktiivsete ainete (hormoonide) tootmiseks. Eluks vajaliku kolesterooli saame toidust ning seda sünteesitakse ka maksas. Et kolesterooli organismis transportida, läheb vaja kolesterooli valguühendeid ehk lipoproteiine.

LDL-kolesterool (**madala** tihedusega lipoproteiin) transpordib 60-70% vere kolesteroolist. Selle ülekülluse korral aga ladestub kolesterool veresoonte seintele, põhjustades ateroskleroosi ehk veresoonte lupjumist. LDL-kolesterooli nimetatakse ka halvaks kolesterooliks. Mida rohkem on inimese veres halba kolesterooli, seda rohkem ohustavad teda südamehaigused.

HDL-kolesterool (**kõrge** tihedusega lipoproteiin) aitab organismil halvast kolesteroolist vabaneda. Seepärast kutsutakse seda ka heaks kolesterooliks. Kui hea kolesterooli sisaldus veres on väike, siis südamehaiguste tekke oht suureneb.

Triglütseriidid on organismis normaalselt esinev rasvaliik, mis on seotud organismi energeetiliste vajaduste rahuldamisega. Triglütseriidide suurenenud sisaldus veres suurendab südamehaiguste riski juhul, kui on suurenenud ka vere kolesteroolisisaldus.

Millised on terve inimese vererasvade väärtused?

- Üldkolesterool (UK) < 5,0 mmol/l
- LDL-kolesterool < 3,0 mmol/l
- HDL-kolesterool > 1,0 mmol/l
- Triglütseriidid (TG) < 1,7 mmol/l

Kui Teil on juba tekkinud tõsiseid probleeme ateroskleroosiga (Teil on diagnoositud infarkt või suhkruhaigus, tehtud pärgarterite laiendamine või operatsioon), siis on Teil vaja saavutada veelgi madalam kolesteroolitase: üldkolesterool < 4,5 mmol/l, LDL-kolesterool < 2,5 mmol/l.

Piimatooted

- 0,05--1% piim
- madala rasvasi-
saldusega juust
- ($< 25\%$ rasva kuivaines)
väheses koguses
 - rasvata kodujuust
 - väherasvased (light)
jogurtid
 - väherasvased
sulatatud juustud ja
määrded
- ($< 20\%$ rasva)
 - pett
 - taimerasvade baasil
valmistatud
- koored
 - 2,5% piim
 - väherasvased juustud
($< 25\text{--}45\%$
rasva kuivaines)
 - jogurtid ja kohupiimad
($< 2,5\%$)
 - kodujuust ($< 4\%$)
 - keefir ($< 2,5\%$)
 - lahjad jäätised
($< 5\%$)
- täispiim ($> 2,5\%$)
- kondenspiim
- kõik koored
- pulberpiim ja koor
- rasvased juustud
($> 45\%$)
- kohupiimad ja
jogurtid ($> 4\%$
rasva)
- sulatatud juustud
ja määrded
($> 45\%$)
- koorejäätis ($> 5\%$)
- kohukesed

Teraviljatooted, maiustused

- täisteraleivatooted
- sepikud
- müsliid, pudrud
- toiduteraviljad (kruup,
odrajahu ja -tangud,
kaera- helbed, tatar)
- leivakuivikud
- tume riis
- kliid ja kliitooted
- tarretised
- kodused, ilma võita
valmistatud
pärmitaignatooted
- nisujahust saiatooted
- halvaa
- martsipan
- valge riis
- magusad saiad ja
küpsed
- küpsised
- šokolaad ja
- -kommid
- rasvas küpsedatud
pirukad
- muna ja koore
baasil tehtud
magustoidud
- tordid
- pudingud

	• vasika- ja taine sealiha • taine ilma nahata linnuliha (kalkun, kana) • taine sink (suitsu-, keedu-) • fileehakkliha	• ulukiliha • lahja linnu- lihavorst • taisest lihast tehtud sea- ja loomahakkliha • taine looma- ja lambaliha	• maksapasteet • siseelundid: maks (kuni 2 korda kuus), aju, kops, neerud, süda • kana- ja kalkuninahk • pekk • kamar
Toiduainete klass	Soovitatavad toidud	Toidud, mida tuleks tarbida mõõdukalt	Toidud, mida tuleks tarbida väga vähe või neist üldse loobuda
Liha (punast liha süüa 1-2 korda nädalas)	• linnuhakkliha • linnulihasült liha tarretises	kana- või vasikalihest viinerid	• rasvane liha (sea-, looma-, lamba-, metslooma-) • rasvane vorst, grillvorst • lihapuljong • suitsuvorst • sardellid • seguhakkliha • sea- ja loomalihaviinerid • sült

Kala (süüa vähemalt 2-3 korda nädalas)	• valged ja vähe rasvased kalad: makrell, tursk, skumbria, tuuni- kala, hõbeheik • forell, lõhe • mageveekalad	• heeringas • kala, õlis praetult • ilma nahata väikekalad (nt sardiinid, räim)	• rasvased ja kolesteroolirohked kalad (sardiinid, angerjas, stauriid) • kalamaks • kalamari (kõik sordid) • kala, võis praetult
	Mereannid		
		• karbid • vähk (homaar) • austrid • teod	• krabid, krevetid, kalmaar • krevetitaolised koorikloomad
Puu-, köögi- ja juurviljad (200-400 g puuvilju või marju päevas, 400-500 g juur- ja köögivilju päevas)	• kõik värsked köögiviljad (v.a avokaado) • soja ja sojatooted • marjad ja enamik puuvilju • küüslauk (2-3 küünt päevas) või küüslaugukapslid • keedetud või fooliumis valmistatud kartul • keedetud ja hautatud juur- ja köögiviljad (eriti oranzid ja rohelised)	• seened • kuivatatud puuviljad • magusad kompotid puu- ja luuviljadest (banaan, ploom, kreek) • avokaado	• praetud või frititud kartul • kartulikrõpsud • suures rasvakoguses valmistatud juur- ja köögivili
Toiduainete klass	Soovitavad toidud	Toidud, mida tuleks tarbida mõõdukalt	Toidud, mida tuleks tarbida väga vähe või neist üldse loobuda

Rasvad, majonees (taimseid rasvu või õli soovitatavalt 2 tl päevas)	- oliivi- ja rapsiõli ning nende baasil valmistatud margariinid - Kreeka pähkli õli - õlikultuuride seemned ja õlid (nt lina)	- väherasvane (<25%) majonees - väherasvane margariin - soja-, maisi- ja päevalilleõli - sojamajonees	- muna baasil majonees - majonees, milles > 25% rasva - koorevõi, võideks - searasv - rasvased tahked margariinid - kookos- ja palmiõli - ploomirasv
Pähklid	- Kreeka pähkel - mandel - kastan	- Brasiilia pähkel - maapähkel - pistaatsiapähkel	- kookospähkel - soolased pähklid
Joogid (olenevalt kehalisest koormusest on soovitatav juua vett toidule lisaks 1-1,2 liitrit päevas)	- vesi, mineraalvesi - tee (must, roheline, ravimtaimedest) - suhkruta naturaalne mahl - vitamiinijoogid (porgandi-, tomati-, ebaküdoonia- ja astelpajumahl, pärmijook) - madala kalorisaldusega karastusjoogid	- masinakohv (kuni 4 tassi päevas) - punane ja valge vein - hele ja lahja õlu NB! Naised mitte üle ühe, mehed mitte üle kahe ühiku päevas! 1 ühik = 12 cl veini või 0,3 l lahjat õlut	- kannukohv - magusad alkohoolsed joogid (liköörid, kreemliköörid, nalivkad) - magusad karastusjoogid - kakao - suhkruga keedised - kange õlu - kanged alkohoolsed joogid - suure suhkrusisaldusega mahlad
Kastmed, maitseained	- taimse õli alusel kastmed - äädika alusel kastmed	- suhkur ja suhkruasendajad - piimakastmed (sõltuvalt piimaprotsendist) - tomatipasta, ketšup	- sool - munakollasega tehtud õlikastmed - muna-, koore- ja majoneesikastmed

Toiduainete klass	Soovitavad toidud	Toidud, mida tuleks tarbida mõõdukalt	Toidud, mida tuleks tarbida väga vähe või neist üldse loobuda
Supid	- juurviljasupid ja -püreed - juurviljapuljongi kuubikud	piimaga köögiviljasupid	- rasvased supid - kreemsupid (koore-, juustuvms)
Makaronitooted	- täisterajahust makaronitooted - nuudlid ilma munata	nisujahust makaronitooted	lasanje
Muna (kuni 2 tk nädalas)	- munavalge - munaasendaja	keedetud muna (soovitatavalt tervisemunad omega-3- rasvhapetega, mis tõstavad „hea kolesterooli“ taset)	- praemuna - munapulber

Kolesterooli sisaldust veres aitab langetada ka ülekaalu vähendamine, sest siis väheneb LDL-kolesterooli kontsentratsioon (ning eriti triglütseriidide sisaldus veres) ja tõuseb HDL-kolesterooli sisaldus. Lisaks õigele toiduvalikule aitab kehakaalu normaliseerida ka kehaline aktiivsus.

Südame tervise seisukohast on vastupidavusharjutused tähtsamad kui jõuharjutused. Kehalise koormuse puhul on oluline mõõduka intensiivsusega katkematu tegevus - käimine, ujumine, suusatamine, jooksmine, sõudmine, aeroobika, tantsimine, jalgrattasõit, kepikõnd jms. Soovitatav treeningukoormus on iga päev vähemalt 30 minutit või 2-3 korda nädalas 1 tund korraga.

Sobiva koormuse saate ise valida, arvestades maksimaalset lubatud pulsisagedust, mis sõltub Teie vanusest.

- Maksimaalne pulsisagedus = $220 - \text{Teie vanus (aastates)} \pm 15$ lööki

Südamele on kasulik, kui liigute või spordite kogu treeningu vältel mõõduka intensiivsusega, nii et Teie pulsisagedus on 60-75% maksimaalsest ealisest pulsisagedusest.

- Näiteks 50-aastaselt inimesel on maksimaalne pulsisagedus:
 - $220 - 50 = 170 (\pm 15)$ lööki minutis
- Liikumiseks soovitatav pulsisagedus on 60% maksimaalsest ealisest pulsisagedusest:
 - $170 \times 60 : 100 = 102 (\pm 15)$ lööki minutis

Treeningu lõppedes peaks treeningueelne pulsisagedus taastuma 10 minuti jooksul. Optimaalse treeningukoormuse määratlemisel pidage kindlasti nõu oma raviarstiga.

Kuidas testida enda haigestumise riski?

Südame-veresoonkonna haigustesse haigestumise riski hindamise lihtsaim viis on mõõta oma taljet ehk vöökoha ümbermõõtu.

Inimesele on omane rasva kogunemine keha eri piirkondadesse, mis annab figuurile iseloomuliku õuna või pirni kuju. Keha sarnaneb pirniga, kui rasv on koondunud peamiselt puusadele ja istmikule - rasva selline kogunemine täidab energiadepoo ülesannet. Õunaga sarnanev figuur kujuneb aga siis, kui rasv ladestub peamiselt kõhuõõnde. Õunakujulise kehaga inimesel on suurem oht haigestuda südame-veresoonkonna haigustesse ja diabeeti. Põhjuseks on rasva ladestumine peamiselt kõhuõõnde, kus rasvarakkudes toodetakse bioaktiivseid aineid, mis soodustavad ateroskleroosi, suhkruhaigust ja trombide teket.

Kuidas mõõta talje ümbermõõtu?

- Võtke sark seljast ja laske vöörihm lõdvaks.
- Pange mõõdulint ümber keskkohta nii, et see jääks võrdsele kaugusele puusaluu ülemisest nukist ja roidekaarest.
- Laske end lõdvaks ja hingake välja. • Märkige üles mõõtmise tulemus.
- Hinnake tulemust: risk suureneb, kui talje ümbermõõt on
 - meestel ≥ 94 cm
 - naistel ≥ 80 cm

Oma tervise eest vastutame eelkõige igaüks ise. Leidke need võimalused, kuidas Teie saate muuta oma elu tervislikumaks, ja üritage saavutada tulemusi. Kui Teil tekib küsimusi, siis ärge häbenege pöörduda oma raviarsti või -õe poole.

Kui osutub vajalikuks määrata Teile ravi, siis teeb selle otsuse arst, kuid ravi edukus sõltub vaid Teist endast - sellest, kui täpselt Te järgite ravisoovitusi ning kas tegutsete vastavalt eelpool toodud infole. Ravimite määramine ei vabasta Teid vajadusest järgida tervisliku toitumise ja elustiili reegleid.

Meil on tuhat põhjust elada ebatervislikult, kuid ainult üks süda!

ITK425

Käesoleva infomaterjali on kooskõlastanud sisekliinik 01.01.2024. a