



IDA-TALLINNA KESKHAIGLA

AS Ida-Tallinna Keskhaigla
Ravi 18, 10138 Tallinn
Rg-kood 10822068
Tel 666 1900
E-post info@itk.ee
www.itk.ee

Larüngoskoopia

Käesoleva infolehe eesmärk on tutvustada patsiendile larüngoskoopiat ehk kõrivalendiku uuringut.

Uuringu olemus

Larüngoskoopia abil saab arst ülevaate patsiendi neelu ja kõri, sh häälepaelte seisukorrast. Uuringu käigus viiakse patsiendile nina kaudu neelu/kõrisesse elastne instrument - larüngoskoop. Selle sisseviimine ei ole valulik, kuid võib olla ebameeldiv.

Larüngoskoopia ei takista hingamist ega neelamist. Ühtlane ja rahulik hingamine tagab uuringu sujuva kulgemise. Uuringu käigus tekkiv sülg tuleb alla neelata. Uuring kestab harilikult 10-15 minutit, vahel veidi kauem.

Uuringu näidustused

Larüngoskoopia on vajalik järgmistel juhtudel:

- neelu ja kõrihaiguste avastamiseks (põletik, närvihaigus, lihashaigus, kasvaja, kaasasündinud muutused, trauma, funktsionaalsed muutused jms)

Uuringu ettevalmistus

Enne uuringut võite juua ja süüa kerget, lahjat sööki.

Uuringu käik

Uuringu ajal palume Teil toolil sirgelt istuda, maksimaalselt lõdvestuda. Larüngoskoopiat teostab arst, keda abistab õde.

Uuringuga seotud riskid

Harilikult taluvad patsiendid larüngoskoopiat hästi ja tüsistusi esineb harva. Uuringu käigus tekkida võivad ohud on suuresti tingitud patsiendi individuaalsusest:

- uuringu või raviprotseduuri käigus võib harva tekkida verejooks

Harilikult on tegemist ninaverejooksuga, mida on lihtne peatada. Palun teavitage uuringu alguses oma kasutatavatest ravimitest uuringu teostajat.

Pärast uuringut

- Uuringu järel võib kohe juua ja süüa, kuid soovitatavalt jahedamat jooki ning toitu, et vältida veritsemise teket.

Kui Teil tekib veel küsimusi larüngoskoopia kohta, küsige palun lisateavet uuringut teostavalt arstilt.

ITK536

Käesoleva infomaterjali on koostöölstanud kirurgiakliinik 01.01.2023. a.