

Radiojoodravi hüpertüreooosi korral

Kilpnäärme ülesanne on toota organismi arengut, kasvu ja ainevahetust reguleerivaid hormone. Ületalitluse korral toodab kilpnäärme hormone liialt palju.

Autoimmuunse kilpnäärme ületalitluse (difuusne toksiline struuma e Gravesi tõbi) korral talitleb ülemäära aktiivselt kogu kilpnäärmekude. Kilpnäärme autonoomse adenoomi ning ületalitleva hulgisõlmelise struuma korral toodavad liigselt hormone kilpnäärme sõlmed.

Radiojoodravi näidustused:

- autoimmuunse kilpnäärme ületalitlus (difuusne toksiline struuma e Gravesi tõbi)
- kilpnäärme autonoomne adenoom (toksiline adenoom)
- ületalitlev hulgisõlmeline struuma

Kilpnäärme ületalitlust pidurdav tabletravi katkestatakse hiljemalt kaks päeva enne radiojoodravi. Vahel tuleb tabletravi mõnda aega pärast radiojoodravi veel jätkata, sel juhul taas alustatakse seda 3. radiojoodravijärgsel päeval. Täpsed juhised saate oma raviarstilt.

4 tundi enne radiojoodi sisaldava kapsli allaneelamist ei tohi süüa. Tohib juua ainult vett. Radiojoodi sisaldava kapsli neelate alla koos veega. Kapsel näeb välja ja on sama hõlpsalt allaneelatav nagu muudegi ravimite kapslid.

Pärast radioaktiivse kapsli manustamist peate järgima juhiseid, mis on Teile kaasa antud dokumendina „Kiirgusohutusnõuded isotoopravi saavale patsiendile“.

Raviprotseduuri näidustuse üle otsustab nukleaarmeditsiiniarst koostöös Teie raviarstiga. Raviks vajalik radioaktiivse joodi annus määratakse eelnevate uuringute alusel. Ravitoime saabub alles kuu-paari möödudes. Tulemuse hindamiseks mõõdetakse kilpnäärme hormoonide taset veres.

Protseduur toimub ambulatoorselt, patsienti haiglasse ei hospitaliseerita.

Lugege protseduuri kohta täpsemalt patsiendile mõeldud [infolehest](#).