



IDA-TALLINNA KESKHAIGLA

AS Ida-Tallinna Keskhaigla
Ravi 18, 10138 Tallinn
Rg-kood 10822068
Tel 666 1900
E-post info@itk.ee
www.itk.ee

Лечение нейроэндокринной опухоли с помощью ^{177}Lu -DOTATATE

Одним из распространенных методов лечения онкологических заболеваний является лучевая терапия с использованием ионизирующего излучения от внешних источников. На опухолевые ткани можно воздействовать и изнутри при помощи радиоактивных препаратов (они вводятся в организм перорально или в виде инъекций).

На поверхности нейроэндокринных опухолей и их метастазов находится много рецепторов соматостатина. Эта особенность позволяет использовать терапию, точно нацеленную против опухолевых клеток — меченый радиоактивным лютецием-177 (^{177}Lu) белок (DOTATATE) присоединяется к соматостатиновым рецепторам опухолевой ткани и уничтожает раковые клетки.

До лечения препаратом ^{177}Lu -DOTATATE необходимо сделать несколько анализов крови и пройти обследование, их Вам назначит лечащий врач.

Перед поступлением в больницу съешьте свой обычный завтрак и выпейте побольше воды (добавьте к обычному питью еще примерно один литр).

При проведении терапии с помощью ^{177}Lu -DOTATATE Вам нужно будет находиться в больнице в течение как минимум одних суток. За это время с помощью гамма-камеры несколько раз будет сделано сканирование, чтобы оценить распределение в организме ^{177}Lu -DOTATATE.

После выписки из больницы Вы можете продолжать жить своей обычной жизнью. В течение следующих 2–3 дней рекомендуется употреблять больше жидкости (2–3 литра в сутки), чтобы защитить почки и способствовать быстрому выведению через почки недействующего в лечении препарата.

После лечебной процедуры персонал проинструктирует Вас о правилах соблюдения радиационной безопасности в общении с другими людьми.